

Jak používat Actolind



Celá rána a její okolí by měla být důkladně vyčištěna roztokem **Actolind® w Solution**, aby se minimalizovalo riziko přenosu patogenů na povrch rány.



Pro optimální vyčištění rány se doporučuje aplikace roztoku **Actolind® w Solution** po dobu alespoň několika minut.



Na vyčištěnou ránu naneste **Actolind® w Gel** v dostatečné vrstvě a podle potřeby a typu rány použijte vhodné krytí nebo obvaz.

Actolind® w Solution

Objem	SUKL	PDK
50ml lahev s rozprašovačem		3605657
250ml lahev s rozprašovačem	5017011	3605640
1000ml lahev	5015397	4943719

Actolind® w Gel

Objem	SUKL	PDK
10ml tuba		4943701
50ml tuba	5015399	3605632

Zdravotnický prostředek třídy III
Dermatologicky testováno.

CE 2195 - CE 2292

PATENTOVANÁ FORMULE

Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme kombinovat použití Actolind w Solution a Gel.

Zdravotnický prostředek, před použitím si pozorně přečtěte návod k použití a uchování.

Actolind®

Polyhexanide + Poloxamer



Urychlené hojení ran



Na doma



Na chalupu



Na cesty



Na dovolenou



CLINIS CZ s.r.o.
Karolinská 654/2
186 00 Karlín - Praha
tel: +420 602 702 741

www.clinis-cz.com
info@clinis-cz.com





- pro každodenní péči o rány
- vhodný pro všechny typy ran
- pro všechny věkové skupiny
- čistí, dezinfikuje a chrání rány
- pohodlné a bezbolestné čištění
- vhodné se všemi typy obvazů na rány
- testováno proti bakteriím MRSA, odstranění biofilmu
- nebrání granulaci ani epitelizaci

Použití na:

Akutní rány
 Pooperační rány
 Nehojící se rány
 Poraněnou kůži
 Radiační rány
 Popáleniny 1. a 2. Stupně a chemické popáleniny
 Infikované rány
 Oblasti vstupu urologický katetru
 Údržbu peristomální kůže, píštělí a abscesů
 Vytvoření bariéry mezi ránou a obvazem
 Rány po plastických operacích
 Poporodní rány a rány po císařském řezu
 Žilní a dolní končetinové vředy
 Diabetické vředy na nohou
 Chemické rány
 Elektrické rány
 Tetování a piercingy (Actolind® nevybledává barevná tetování, protože neobsahuje alkohol)
 Je nezbytný v lékárně první pomoci.

Je určený i pro děti (vzhledem k nedostatečným klinickým informacím by měl být Actolind® používán u novorozenců a kojenců pouze pod přísným a pečlivým lékařským dohledem).

- Urychlené hojení ran
- Antimikrobiální efekt
- Zabraňuje infekci ran
- Zvlhčení rány

Polyhexanide má hojivý účinek na rány, snižuje počet bakterií v ranách a nevede k bakteriální rezistenci (1-2).

Poloxamer může způsobit opravu buněčné membrány a potlačit agregaci proteinů. Poloxamer prokázal antibiofilmové schopnosti in vitro prostřednictvím snížení přichycení mikroorganismů a tvorby biofilmu (3).



1. Leaper DJ, Schultz G, Carville K et al. Extending the TIME concept: what have we learned in the past 10 years?(*). Int Wound J 2012; 9 (suppl 2): 1 – 19
2. Hübner NO, Kramer A. Review on the efficacy, safety and clinical applications of polyhexanide, a modern wound antiseptic. Skin Pharmacol Physiol 2010; 23 (suppl): 17 – 27.
3. Percival SL et al. (2018) Mode of action of poloxamer-based surfactants in wound care and efficacy on biofilms. Int Wound J15(5): 749–755

Actolind® W Solution

Roztok pro zvlhčení a ošetření akutních, chronických a infikovaných ran

Actolind® w Solution čistí rány mechanicky.

Obsažené povrchově aktivní látky poskytují pohodlné a bezbolestné čištění, potřebné před ošetřením ran a snižují povrchové napětí.

Actolind® w Solution přispívá k procesu hojení ran zajištěním vysoce pozitivního čistícího a zvlhčujícího účinku na aplikované oblasti.

Actolind® w Solution lze také použít k antiseptickému čištění a změkčení obvazových materiálů.

Obvazy a obinadla vysušené a přilnuté k ráně mohou být před odstraněním zvlhčeny roztokem Actolind® w Solution, takže mikroorganismy usazené na nich mohou být odstraněny, aniž by došlo k sekundárnímu poranění rány.

Antimikrobiální účinek přípravku Actolind® w Solution nabízí ideální řešení prevence tvorby biofilmu na obvazech a obinadlech.

Roztok Actolind® w Solution neinhibuje granulaci ani epitelizaci



Actolind® W Gel

Ochranný zvlhčující a ošetřující gel pro akutní chronické a infikované rány

Actolind® Gel je ochranný, hydratační a hojivý gel.

Vytváří jemnou tenkou bariérovou vrstvu mezi ránou a obvazem, čímž minimalizuje přilnavost.

Má antimikrobiální účinek, který zabraňuje infekci.

Urychluje hojení: akutních ran, jako jsou řezné rány, pooperační rány, vředy a chronické rány, popáleniny (1. a 2. stupně), tetování bez změny barevnosti a mnoha dalších.

Actolind® Gel je vhodný také pro použití u dětí (pod lékařským dohledem).

Actolind® Gel je klíčovým prvkem v sadě první pomoci.

