

Pro vícero použití

Netoxický

Bezbolestný

Účinný proti biofilmu

Kompatibilní se všemi typy obvazů na rány

VRE, testováno na účinnost proti MRSA

PHMB je první volbou pro:


- kriticky kolonizované rány
- rány s rizikem infekce
- popáleniny
- prevence proti infekci v místě chirurgického zákroku
- dekontaminaci akutních a chronických ran

Polyhexanid + Poloxamer


Jak používat Actolind



Celá rána a její okolí by měla být důkladně vyčištěna roztokem Actolind® w Solution, aby se minimalizovalo riziko přenosu patogenů na povrch rány.



Pro optimální vyčištění rány se doporučuje aplikace roztoku Actolind® w Solution po dobu alespoň několika minut.



Na vyčištěnou ránu naneste Actolind® w Gel v dostatečné vrstvě a podle potřeby a typu rány použijte vhodné krytí nebo obvaz.



PŘED



PO

Actolind® w Solution		
	Objem	PDK
Actolind w Solution	50ml lahev s rozprašovačem	3605657
Actolind w Solution	250ml lahev s rozprašovačem	3605640
Actolind w Solution	1000ml lahev	4943719

Actolind® w Gel		
	Objem	PDK
Actolind w Gel	10ml tuba	4943701
Actolind w Gel	50ml tuba	360563

Zdravotnický prostředek třídy III
CE 2195 - CE 2292

PATENTOVANÁ FORMULE

Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme kombinovat použití Actolind w Solution a Gel.



Dostupné ve vaší lékárně

CLINIS CZ s.r.o.
Karolinská 654/2
186 00 Karlín - Praha

tel: +420 602 702 741
www.clinis-cz.com
info@clinis-cz.com

For more information :



Actolind®

Akutní, chronické a infikované rány

- Ochrana
- Zvlhčení
- Antimikrobiální efekt

URYCHLUJE HOJENÍ RAN A POPÁLENIN



Použití na:

- Akutní rány
- Pooperační rány
- Nehojící se rány
- Poraněnou kůži
- Radiační rány
- Popáleniny 1. a 2. stupně a chemické popáleniny
- Infikované rány
- Oblasti vstupu urologický katetrů
- Údržbu peristomální kůže, píštělí a abscesů
- Vytvoření bariéry mezi ránou a obvazem
- Rány po plastických operacích
- Poporodní rány a rány po císařském řezu
- Žilní a dolní končetinové vředy
- Diabetické vředy na nohou
- Chemické rány
- Elektrické rány
- Tetování a piercingy (Actolind® nevybledává barevná tetování, protože neobsahuje alkohol)
- Je nezbytný v lékárně první pomoci.

Actolind® je určený i pro děti*

* Vzhledem k nedostatečným klinickým informacím by měl být Actolind® používán u novorozenců a kojenců pouze pod přísným a pečlivým lékařským dohledem.

Actolind® w Solution

Antimikrobiální irigace pro čištění, zvlhčování a péči o rány



Aplikátor ve formě spreje

Actolind® w Gel


Ochranný zvlhčující a ošetřující gel pro akutní, chronické a infikované rány



Polyhexanid + Poloxamer

Aplikace přípravku Actolind nezpůsobuje podráždění ani bolest

Vytváří ochrannou bariéru, která zabraňuje reinfekci a udržuje oblast čistou a vlhkou



Efektivní

Chrání ránu a její okolí a vytváří tenkou ochrannou vrstvu.



Šetrný k pacientovi

Vytváří bariéru mezi povrchem rány a obvazem, minimalizuje přilepení obvazů a umožňuje bezbolestnou výměnu obvazů.



Ochranný

Poskytuje antimikrobiální ochranu, čímž zabraňuje možným opakovaným infekcím. Vysoce účinný proti multirezistentním organismům (MRSA, VRE) a mykotickým patogenům (C.albicans).



Hojivý

Udržuje povrch rány v čistotě a poskytuje vlhkost a péči, urychluje hojení ran a popálenin.



Podpůrný

Účinná péče díky synergickému účinku poloxameru a polyhexanidu (PHMB).



Dermatologicky testovaný

Nezpůsobuje podráždění ani bolestivost.



Jemný

Vysoce biokompatibilní

Neinhibuje granulaci ani epitelizaci. Vhodný pro dlouhodobou léčbu. Dobře snášen alergickými a diabetickými pacienty.